



Les maladies et les vaccinations

Le chaton que vous venez d'acquérir a peut-être déjà reçu une injection de vaccin. Il convient cependant d'effectuer plusieurs rappels successifs pour une bonne protection. Certaines vaccinations peuvent être commencées à 8 semaines d'âge et d'autres à 3 mois. Nous sommes disponibles pour vous apporter tous les conseils quant aux soins nécessaires à votre animal.



Pourquoi vacciner ?

Les maladies infectieuses du chat sont très difficiles à éradiquer, c'est pourquoi il est préférable de vacciner les chatons le plus tôt possible.

Des anticorps transmis par le lait de leur mère protègent les chatons pendant 2 à 3 mois. Ainsi, on conseille de commencer à vacciner vers l'âge de 2 mois, pour prendre le relais de cette protection maternelle. Les premières vaccinations se réalisent en plusieurs injections successives en adaptant leur rythme à chaque animal selon son mode de vie, la présence d'épidémies et la législation en vigueur.

Comment prévenir les principales maladies infectieuses du chat ?

La rage, le coryza, le typhus et la leucose sont à l'heure actuelle les grandes maladies infectieuses du chat pour lesquelles il existe des vaccins.

La rage : cette maladie mortelle pour l'homme et l'animal est surtout transmise par l'intermédiaire d'animaux sauvages contaminés. La rage est devenue rare sur le territoire français, mais elle reste présente à nos frontières. La vaccination antirabique du chat peut être obligatoire dans certains cas.

Le Coryza : Il provoque une atteinte de l'appareil respiratoire supérieur. Le chat présente des conjonctivites, des écoulements nasaux, parfois des ulcères dans la bouche et de la toux. La

contamination a lieu par l'intermédiaire des sécrétions respiratoires. Le coryza est une maladie très contagieuse.

Le Typhus : Cette maladie, souvent mortelle, se manifeste par une diarrhée aiguë et une baisse importante des défenses immunitaires.

La leucose féline : La contamination des chats a lieu par contact direct de nez à nez, ainsi que par morsure. Après quelques mois ou années, le chat présente des troubles multiples comme des avortements, des cancers des cellules sanguines, des anémies ou des atteintes neurologiques.

L'immunodéficiência féline : Le virus responsable de l'immunodéficiência féline se transmet surtout par morsure. La maladie commence par une longue période pendant laquelle les chats contaminés restent apparemment en bonne santé. Ils ne présentent pas de symptôme mais ils sont séropositifs et contagieux. Contrairement aux maladies précédemment citées, il n'existe actuellement pas de vaccin pour prévenir la transmission de l'immunodéficiência féline. La stérilisation précoce, vers l'âge de 6 mois, permet de réduire les bagarres et les fugues, donc les risques de contamination.



**Clinique
vétérinaire Urt**